







性・年齢クラス判別の基準

兵庫県 森林動物研究センター (2009.12 作成)
Wildlife Management Research Center, Hyogo


♂	♀
<p>B (Baby) 0歳 移動時に母親にくっついていて、後ろから見て陰のう（ワントンのような皮）が見える。</p> 	<p>B (Baby) 0歳 移動時に母親にくっついていて、後ろから見て、陰のうが見えない。</p> 
<p>J (Juvenile) 1～3歳 後ろから見て陰のう（ギョウザの皮のようなもの）が見えるが、睾丸が降りていない。</p> 	<p>J (Juvenile) 1～3歳 後ろから見て、陰のうも性皮も見えない。</p> 
<p>YA (Young Adult) 4～6歳 睾丸が降りているが、白い。 若齢だと睾丸が上がって見えないこともある。</p> 	<p>YA (Young Adult) 4～6歳 性皮が若干赤味がかっているが、露出面積はほとんどない。乳首が目立たない。 最初の発情時に赤くはれあがる</p> 
<p>A (Adult) 7歳以上 睾丸が降りていて、ピンク色か赤味がかっている。体が大きい。</p> 	<p>A (Adult) 7歳以上 性皮が赤く露出している。乳首が長く目立つ。アカンボウを持っていることがある。 加齢とともに性皮がひろがる</p> 

体格・姿勢 比較

体格




- ・肩から尻のラインが水平か弓なり
- ・尾を上げていることが多い
- ・堂々とした歩き方
- ・手足がスツと長くみえる



- ・お尻が丸まる
- ・尾を下げている

体サイズ 比較



A♀ 経産個体は
乳首が伸びている

